

別表2 主な傷病の有病率

令和2年(2020年)10月

| 主な傷病 | 全体 (126,146) | 男性 (61,350) | 女性 (64,797) | 年齢区分 | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | 75歳以上 (18,602) | 65-74歳 (17,425) | 20~64歳 (69,382) | 20歳以下 (20,738) |
| 高血圧疾患 | 11.92% | 11.17% | 12.63% | 34.97% | 27.16% | 5.44% | 0.04% |
| 歯科関連疾患(う蝕、歯肉炎、歯の補てつ) | 11.01% | 9.30% | 12.63% | 17.57% | 18.61% | 8.40% | 7.67% |
| ┌ 歯肉炎及び歯周疾患 | 6.82% | 5.52% | 8.05% | 11.22% | 12.20% | 5.16% | 4.06% |
| └ う蝕 | 2.29% | 2.05% | 2.52% | 1.82% | 2.54% | 2.01% | 3.53% |
| ┌ 歯の補てつ | 1.90% | 1.73% | 2.06% | 4.53% | 3.87% | 1.24% | 0.08% |
| 脂質異常症 | 3.18% | 2.04% | 4.26% | 6.38% | 8.11% | 2.02% | 0.01% |
| 2型糖尿病 | 2.93% | 3.59% | 2.31% | 6.42% | 7.36% | 1.75% | 0.02% |
| 悪性新生物<腫瘍> | 2.90% | 2.94% | 2.86% | 7.75% | 6.33% | 1.58% | 0.06% |
| 心疾患(高血圧性のものを除く) | 2.42% | 2.87% | 1.99% | 8.83% | 4.65% | 0.84% | 0.09% |
| ┌ 不整脈及び伝導障害 | 0.76% | 0.88% | 0.65% | 2.47% | 0.37% | 1.04% | 0.04% |
| └ 狭心症 | 0.68% | 0.85% | 0.52% | 2.19% | 0.35% | 0.90% | 0.00% |
| ┌ 心不全 | 0.44% | 0.43% | 0.44% | 1.78% | 0.15% | 0.41% | 0.01% |
| └ 陳旧性心筋梗塞 | 0.17% | 0.29% | 0.06% | 0.42% | 0.12% | 0.27% | 0.00% |
| ┌ その他の虚血性心疾患 | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.25% | 0.03% | 0.25% | 0.01% |
| └ 急性心筋梗塞 など | 0.06% | 0.09% | 0.03% | 0.18% | 0.03% | 0.10% | 0.00% |
| 緑内障 | 1.86% | 1.68% | 2.03% | 5.37% | 3.96% | 0.94% | 0.04% |
| 喘息 | 1.42% | 1.35% | 1.50% | 1.39% | 1.41% | 1.05% | 2.77% |
| 脳血管疾患 | 1.38% | 1.53% | 1.24% | 5.12% | 2.80% | 0.43% | 0.02% |
| ┌ 脳梗塞 | 0.95% | 1.07% | 0.84% | 0.00% | 0.23% | 1.88% | 3.82% |
| └ 脳内出血 | 0.16% | 0.19% | 0.13% | 0.00% | 0.08% | 0.34% | 0.44% |
| └ くも膜下出血 | 0.05% | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.03% | 0.09% | 0.13% |
| 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 1.36% | 1.09% | 1.63% | 1.28% | 1.35% | 1.77% | 0.09% |
| 白内障 | 1.36% | 1.03% | 1.68% | 4.99% | 3.66% | 0.19% | 0.00% |
| 骨粗しょう症 | 1.08% | 0.13% | 1.97% | 4.49% | 2.28% | 0.18% | 0.00% |
| アトピー性皮膚炎 | 0.99% | 1.06% | 0.93% | 0.25% | 0.26% | 0.99% | 2.26% |
| 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 0.99% | 0.76% | 1.20% | 0.68% | 0.99% | 1.26% | 0.32% |
| 睡眠障害 | 0.92% | 1.17% | 0.69% | 1.11% | 1.49% | 0.98% | 0.04% |
| 骨折(頸部、胸部、骨盤〔脊椎含む〕、大腿骨、その他四肢) | 0.75% | 0.53% | 0.96% | 2.40% | 0.95% | 0.35% | 0.43% |
| ┌ 頸部、胸部及び骨盤の骨折(脊椎を含む) | 0.26% | 0.16% | 0.35% | 1.18% | 0.28% | 0.07% | 0.03% |
| └ 大腿骨の骨折 | 0.12% | 0.05% | 0.19% | 0.61% | 0.15% | 0.02% | 0.00% |
| └ その他の四肢の骨折 | 0.37% | 0.31% | 0.43% | 0.61% | 0.52% | 0.26% | 0.40% |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.70% | 0.68% | 0.71% | 0.50% | 0.99% | 0.87% | 0.03% |
| 関節リウマチ | 0.63% | 0.30% | 0.95% | 1.40% | 1.47% | 0.40% | 0.00% |
| アルツハイマー病 | 0.63% | 0.36% | 0.89% | 3.86% | 0.40% | 0.01% | 0.00% |
| 慢性腎臓病 | 0.50% | 0.66% | 0.35% | 1.48% | 0.96% | 0.27% | 0.00% |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 0.29% | 0.43% | 0.15% | 1.04% | 0.65% | 0.07% | 0.01% |
| パーキンソン病 | 0.23% | 0.21% | 0.25% | 0.97% | 0.49% | 0.03% | 0.00% |
| ウイルス性肝炎(B型、C型肝炎合計) | 0.19% | 0.18% | 0.20% | 0.38% | 0.42% | 0.14% | 0.00% |
| 痛風 | 0.19% | 0.37% | 0.01% | 0.19% | 0.31% | 0.21% | 0.00% |
| 消化性潰瘍(胃・十二指腸) | 0.18% | 0.20% | 0.17% | 0.47% | 0.33% | 0.12% | 0.00% |
| 血管性及び詳細不明の認知症 | 0.17% | 0.10% | 0.23% | 1.03% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
| 難聴 | 0.16% | 0.14% | 0.18% | 0.42% | 0.25% | 0.09% | 0.10% |
| 潰瘍性大腸炎 | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.10% | 0.24% | 0.17% | 0.02% |
| 子宮内膜症 | 0.14% | 0.00% | 0.26% | 0.01% | 0.00% | 0.24% | 0.00% |
| 女性不妊症 | 0.13% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% |
| 鉄欠乏性貧血 | 0.12% | 0.04% | 0.20% | 0.11% | 0.07% | 0.16% | 0.04% |
| 1型糖尿病 | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.11% | 0.18% | 0.12% | 0.03% |
| 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.18% | 0.18% | 0.08% | 0.00% |
| 過敏性腸症候群 | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.10% | 0.09% | 0.05% |
| 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 0.09% | 0.06% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.04% | 0.00% |
| 胆石症 | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.24% | 0.17% | 0.04% | 0.00% |
| 帯状疱疹 | 0.07% | 0.06% | 0.09% | 0.25% | 0.11% | 0.04% | 0.01% |
| アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害 | 0.05% | 0.08% | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.05% | 0.00% |
| アルコール性肝疾患 | 0.04% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.04% | 0.00% |
| 慢性膵炎 | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.10% | 0.09% | 0.03% | 0.00% |
| クローン病 | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.01% |
| 腸閉塞 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.00% |
| 結核 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.00% |

【資料】有病率は、令和2年 患者調査(厚生労働省)「総患者数、性・年齢階級(5歳)×傷病分類別」(表36)、「×傷病小分類別」(表37)の主な傷病の患者数と「受療率の算出に用いた人口(全国人口)」(2020年10月の人口動態統計、表5-1)を用いて算出しています。0.00%はそれ以下を示す場合もあります。その他は、別表1の【資料】に準じます。